


Herenboeren

Op dinsdagavond 11 augustus waren we op bezoek bij de Heerenboeren aan de Groeneweg in Bergen. De Excursie startte bij de kas. We liepen door de akkers en volgden de slootranden om te eindigen bij een natuurvriendelijke oever. All wilde planten die we tegenkwamen werden genoteerd. Uiteindelijk wisten we meer dan honderd soorten op naam te brengen.

Tussen de gewassen vonden we soorten als stippelganzevoet, papegaaienkruid en uitstaande melde. Langs de oevers stond onder andere scherpe zegge, moeraswalstro, veerdelig tandzaad en knikkend tandzaad. Op de natuuroever vonden we pijptorkruid. Dit groeide hier samen met rode waterereprijs, egelboterbloem en moerasdroogbloem.

Er werden ook wat planten uit de sloten gevist. Tussen de kikkerbeet vonden we grof hoornblad en ook zittenda zannichellia. Deze laatste soort is thuis door Jeanette op naam gebracht. De zittende vruchtjes gaven de doorslag. Verder werd waternetje boven water gehaald. Dit is een algensoort, waarbij de planten een netvormige structuur vormen.

Al met al weer een interessante excursie!



Zittende zannichellia - *Zannichellia palustris* subsp. *palustris*

Ecologie & verspreiding

Zittende zannichellia is te vinden in zonnig tot beschaduwde, stilstaand, niet te diep, langzaam tot snel stromend, basen- en kalkrijk, voedselarm tot matig voedselrijk, zoet, soms zwak brak water boven een kalkrijke zand- of kleibodem. Ze staat in riviertjes en beekjes, in sloten, poelen en vaarten, in veedrinkpoelen en grindgaten, in gegraven klei- en zandputten. Ze groeit in bijna alle werelddelen, in Europa voornamelijk in het noorden en het midden van het continent. In Nederland is ze vrij algemeen in het westen en noorden, zeldzaam in het duindistrict en het riviereengebied en zeer zeldzaam in de zandstreken in het midden en het oosten van het land. De bladeren van deze ondersoort zijn lichtgroen en tot 1 mm breed. De vruchten zijn grijsachtig, hooguit 2,5 mm lang en de snavel is kleiner is dan de vruchthelft en is zittend of zelden zeer kort gesteeld.


Bodem

Zonnige plaatsen in ondiep, matig voedselrijk tot zeer voedselrijk, hard, neutraal tot alkalisch, ionenrijk, meestal zoet, stilstaand of stromend, kalkhoudend water met een bodem van klei of zand. In het binnenland is het vaak een indicator van verontreinigd water.

Groeiplaats

Water (grote zee-inhammen waarin het zoute water door rivieren wordt verdund) beken, kleine rivieren, in de oeverzone van pas gegraven klei- en zandputten en grindgaten, bijv. in het winterbed van grote rivieren, sloten, vaarten, beken, poelen en soms op droogvallende delen van sloten en veedrinkpoelen).

Bron: NDFF Verspreidingsatlas



Komende excursie

Dinsdag 18 augustus: Zuurvenspolder

We zoeken vanavond weer wat vochtige delen op om te bekijken. De excursie start om 19.30 uur op het parkeerterrein tegenover de Mathieu Wiegmanschool aan het Zakedijkje 38 in Bergen.



Pieter Korstanje,
06-55448866
f2hheipie@hetnet.nl

Totaaloverzicht Herenboeren, 11 juli 2026

Gewone esdoorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Wilde bertram	<i>Achillea ptarmica</i>
Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>
Grote waterweegbree	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>
Geknikte vossenstaart	<i>Alopecurus geniculatus</i>
Papegaaienkruid	<i>Amaranthus retroflexus</i>
Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>
Uitstaande melde	<i>Atriplex patula</i>
Spiesmelde	<i>Atriplex prostrata</i>
Knikkend tandzaad	<i>Bidens cernua</i>
Veerdelig tandzaad	<i>Bidens tripartita</i>
Heen	<i>Bolboschoenus maritimus</i>
Zwarte mosterd	<i>Brassica nigra</i>
Zwanenbloem	<i>Butomus umbellatus</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Scherpe zegge	<i>Carex acuta</i>
Scherpe zegge	<i>Carex acuta</i>
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>
Grof hoornblad	<i>Ceratophyllum demersum</i>
Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>
Stippelganzenvoet	<i>Chenopodium ficifolium</i>
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Eenstijlige meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>
Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>
Kamgras	<i>Cynosurus cristatus</i>
Gewone kroppaar	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>
Europese hanenpoot	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Gewone waterbies	<i>Eleocharis palustris</i>
Kweek	<i>Elymus repens</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>
Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>
Hoge fijnstraal	<i>Erigeron sumatrensis</i>
Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>
Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>
Moeraswalstro	<i>Galium palustre</i>
Moerasdroogbloem	<i>Gnaphalium uliginosum</i>
Gewone berenklauw	<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Gladde witbol	<i>Holcus mollis</i>
Kikkerbeet	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>

Gewone waternavel	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>
Gele lis	<i>Iris pseudacorus</i>
Zomprus	<i>Juncus articulatus</i>
Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>
Biezenknoppen	<i>Juncus conglomeratus</i>
Pitrus	<i>Juncus effusus</i>
Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>
Bultkroos	<i>Lemna gibba</i>
Klein kroos	<i>Lemna minor</i>
Puntkroos	<i>Lemna trisulca</i>
Kleine varkenskers	<i>Lepidium didymum</i>
Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>
Moerasrolklaver	<i>Lotus pedunculatus</i>
Wolfspoot	<i>Lycopus europaeus</i>
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>
Echte kamille	<i>Matricaria chamomilla</i>
Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>
Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>
Pijptorkruid	<i>Oenanthe fistulosa</i>
Grote klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>
Veenwortel	<i>Persicaria amphibia</i>
Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>
Rietgras	<i>Phalaris arundinacea</i>
Gewoon timoteegras	<i>Phleum pratense</i>
Riet	<i>Phragmites australis</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>
Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>
Heelblaadjes	<i>Pulicaria dysenterica</i>
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>
Egelboterbloem	<i>Ranunculus flammula</i>
Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>
Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>
Moeraskers	<i>Rorippa palustris</i>
Dijkviltbraam	<i>Rubus armeniacus</i>
Kluwenzuring	<i>Rumex conglomeratus</i>
Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>
Schietwilg	<i>Salix alba</i>
Grauwe wilg	<i>Salix cinerea subsp. cinerea</i>
Gewone vlier	<i>Sambucus nigra</i>
Ruwe bies	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>
Vertakte leeuwentand	<i>Scorzoneroidees autumnalis</i>
Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i>
Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>
Grote egelskop	<i>Sparganium erectum</i>
Veelwortelig kroos	<i>Spirodela polyrhiza</i>

Moerasandoorn	<i>Stachys palustris</i>
Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>
Zulte	<i>Tripolium pannonicum</i>
Grote lisdodde	<i>Typha latifolia</i>
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>
Rode waterereprijs	<i>Veronica catenata</i>
Zittende zannichellia	<i>Zannichellia palustris subsp. palustris</i>