

Zuurvenspolder

Op 18 augustus bezochten we het stukje natuurontwikkeling langs de rand van de Zuurvenspolder. Bij de aanleg, ruim tien jaar geleden, is hier maaisel uitgestrooid uit het Zwanenwater. Het gebiedje heeft zich in de loop van de tijd leuk ontwikkeld. Op de vochtige delen is wat veengroei op gang gekomen met een schrale vegetatie van struik- en dophei met tormentil, moeraswolfsklauw, stijve ogentroost, trekrus en dwergzegge. Nog vochtiger staat paddenrus, samen met gevleugeld hertshooi en oeverzegge. Ook staat er een enkele dotterbloem.

Verder staat hier de gele bieslelie. Dit is een invasieve exoot, die vooral veel opduikt op natuurontwikkelingslocaties. Lastig hoe hier mee om te gaan. Wanneer je probeert om alle bieslelies weg te graven, verniel je gelijk het hele gebiedje. Wanneer je hem laat staan kan de locatie weer een bron vormen voor verdere verspreiding. Een lastig dilemma dus.

Vondst van de avond van het dwergglas. Eerst vond Jeanette één plantje. Toen we eenmaal een zoekbeeld hadden, zagen we er aardig wat staan. Leuk dat ook zo'n fragiele soort zich zo lang weer te handhaven op deze plek.



dwergzegge



grote wederik met wederikmijt



moeraswolfsklauw



gele bieslelie (uitgebloeid)



wesp spin



rugstreeppad




veenmos

Dwergglas – *Radiola rinoides*

Ecologie & verspreiding

Dwergglas is een pioniersoort en groeit op zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselarme, uitgesproken stikstofarme tot stikstofarme, iets basische tot zwak zure zand- leem- en veengrond en op stenige plaatsen; ze verdraagt zwak brakke milieus. De plant staat op heiden en schrale graslanden, in duinvalleien en in laagblijvend duingrasland, op droogvallende bodems van vennen, duinplasjes, vijvers, verder langs vochtige bospaden, op ijsbaantjes, in akkers en tussen straatstenen. Het Europese deel van het areaal is sterk verbrokken, maar Nederland valt geheel binnen een van die brokstukken. De soort is in Nederland vrij zeldzaam in het Waddendistrict, zeldzaam in de Zeeuwse duinen en op Goeree en zeer zeldzaam in het noordoosten en oosten van het land, Gelderland en Utrecht. De enorme achteruitgang van Dwergglas in Nederland is niet alleen toe te schrijven aan ontginning, toegenomen bemesting en ontwatering, maar ook aan het dichtgroeien van de vroegere groeiplaatsen. Dwergglas is kensoort voor het Dwergbiezen-verbond.


Bron: NDFF-Verspreidingsatlas



Komende excursie

Dinsdag 25 augustus: Stadsexcursie Alkmaar

Alweer de laatste excursie van dit seizoen! We eindigen met een excursie in het stedelijk gebied van Alkmaar. Omdat het al vroeger donker is, starten we om **19.00 uur**. Verzamelpunt is de kruising Kruseman van Eltenweg / Nicolaas Beetskade.



Pieter Korstanje,
06-55448866
f2hheipie@hetnet.nl

Totaaloverzicht Zuurvenspolder, 18 augustus 2026

Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Wilde bertram	<i>Achillea ptarmica</i>
Gewoon struisgras	<i>Agrostis capillaris</i>
Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>
Grote waterweegbree	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>
Heemst	<i>Althaea officinalis</i>
Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>
Ruwe berk	<i>Betula pendula</i>
Struikhei	<i>Calluna vulgaris</i>
Gewone dotterbloem	<i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Dwergzegge	<i>Carex oederi</i>
Oeverzegge	<i>Carex riparia</i>
Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Eenstijlige meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>
Kamgras	<i>Cynosurus cristatus</i>
Brem	<i>Cytisus scoparius</i>
Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>
Peen	<i>Daucus carota</i>
Gewone waterbies	<i>Eleocharis palustris</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Gewone dophei	<i>Erica tetralix</i>
Stijve ogentroost	<i>Euphrasia stricta</i>
Rood zwenkgras	<i>Festuca rubra</i>
Moerasspirea	<i>Filipendula ulmaria</i>
Moeraswalstro	<i>Galium palustre</i>
Schermhavikskruid	<i>Hieracium</i> sect. <i>Hieracioides</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Gewone waternavel	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>
Gevleugeld hertshooi	<i>Hypericum tetrapterum</i>
Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>
Gele lis	<i>Iris pseudacorus</i>
Gewoon jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>
Zomprus	<i>Juncus articulatus</i>
Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>
Trekrus	<i>Juncus squarrosus</i>
Paddenrus	<i>Juncus subnodulosus</i>
Engels raigras	<i>Lolium perenne</i>
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>corniculatus</i>
Moerasrolklaver	<i>Lotus pedunculatus</i>
Gewone veldbies	<i>Luzula campestris</i>

Wolfspoot	<i>Lycopus europaeus</i>
Grote wederik	<i>Lysimachia vulgaris</i>
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>
Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>
Moeraskartelblad	<i>Pedicularis palustris</i>
Heidekartelblad	<i>Pedicularis sylvatica</i>
Veenwortel	<i>Persicaria amphibia</i>
Waterpeper	<i>Persicaria hydropiper</i>
Gewoon timoteegras	<i>Phleum pratense</i>
Riet	<i>Phragmites australis</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>
Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>
Zilverschoon	<i>Potentilla anserina</i>
Tormentil	<i>Potentilla erecta</i>
Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>
Zomereik	<i>Quercus robur</i>
Dwergvlas	<i>Radiola linoides</i>
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>
Egelboterbloem	<i>Ranunculus flammula</i>
Blaartrekkende boterbloem	<i>Ranunculus sceleratus</i>
Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>
Grauwe wilg	<i>Salix cinerea subsp. cinerea</i>
Kruipwilg	<i>Salix repens</i>
Blauw glidkruid	<i>Scutellaria galericulata</i>
Gele bieslelie	<i>Sisyrinchium californicum</i>
Late guldenroede	<i>Solidago gigantea</i>
Grote egelskop	<i>Sparganium erectum</i>
Grasmuur	<i>Stellaria graminea</i>
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>